

Aves Marinas y Playeras

Área Educación Ambiental - Fundación Patagonia Natural



Aves Marinas y Playeras

Área Educación Ambiental - Fundación Patagonia Natural



Pan American
ENERGY

**Consolidación e Implementación del Plan de Manejo Integrado
de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad
ARG/02/G31**

El Programa de Educación Ambiental de la Fundación Patagonia Natural, fue declarado de interés por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros. Disposición N° 1/08.

Elaboración de los textos por orden alfabético:

Alexandra Sapoznikow,
Cecilia Reeves,
Griselda Sessa,
Lidia Mansur y
Martín de la Reta.

Ilustraciones:

Guillermo Harris.

Revisión:

María del Carmen Taboada y
Paula Useglio

Diseño:

Jimena M. Esteves I.

Fundación Patagonia Natural

Marcos A. Zar 760
(9120) Puerto Madryn - Chubut
Tel/Fax: (02965) 451920 / 472023 / 474363
E-mail: pnatural@patagonianatural.org
www.patagonianatural.org

Indice

Prólogo	7
Fundación Patagonia Natural	9
Contenido de las Fichas de Aves Marinas y Playeras	11
Introducción	13
Pingüino Penacho Amarillo - <i>Eudyptes chrysocome</i>	17
Pingüino de Magallanes - <i>Spheniscus magellanicus</i>	19
Albatros Errante - <i>Diomedea exulans</i>	21
Albatros Ceja Negra - <i>Thalassarche melanophrys</i>	22
Petrel Gigante del Sur - <i>Macronectes giganteus</i>	23
Pardela Oscura - <i>Puffinus griseus</i>	25
Pardela Cabeza Negra - <i>Puffinus gravis</i>	26
Biguá - <i>Phalacrocorax olivaceus</i>	27
Cormorán Gris - <i>Phalacrocorax gaimardi</i>	29
Cormorán Cuello Negro - <i>Phalacrocorax magellanicus</i>	31
Cormorán Imperial - <i>Phalacrocorax atriceps</i>	32
Ostrero Común - <i>Haematopus palliatus</i>	34
Ostrero Austral o del Sur - <i>Haematopus leucopodus</i>	35
Ostrero Negro - <i>Haematopus ater</i>	36
Chorlo Cabezón - <i>Oreopholus ruficollis</i>	37
Chorlito Doble Collar - <i>Charadrius falklandicus</i>	38
Chorlito Ceniciento - <i>Pluvianellus socialis</i>	39
Playerito Blanco - <i>Calidris alba</i>	40
Playero Rojizo - <i>Calidris canutus</i>	41
Playero de Rabadilla Blanca - <i>Calidris fuscicollis</i>	42
Playerito Trinador - <i>Numenius phaeopus</i>	43
Becasa de Mar - <i>Limosa haemastica</i>	44
Paloma Antártica - <i>Chionis alba</i>	45
Escúa Antártico - <i>Catbaracta antarctica</i>	46
Gaviota Austral - <i>Larus scoresbii</i>	47
Gaviota Cocinera - <i>Larus dominicanus</i>	48
Gaviota de Olrog - <i>Larus atlanticus</i>	49
Gaviota Capucho Café - <i>Larus maculipennis</i>	50
Gaviotín Sudamericano - <i>Sterna hirundinacea</i>	51
Gaviotín Pico Amarillo - <i>Sterna eurygnatha</i>	52
Gaviotín Real - <i>Sterna maxima</i>	54
Categorías utilizadas por la UICN para definir el estado de conservación de las especies.	55
Bibliografía consultada	56

Prólogo

En la costa Argentina reproducen 17 especies de aves marinas: gaviotas, gaviotines, pingüinos, cormoranes, petreles y escúas y se alimentan en nuestra plataforma continental, cerca de 60 especies que nidifican en la zona costera patagónica, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en lugares muy lejanos.

Esta peculiaridad convierte a nuestras costas en un escenario de increíble belleza y altísima sensibilidad que concentra la atención de especialistas y viajeros del mundo.

Las aves marinas reproducen en colonias ubicadas en la costa o en islas. En general, son fieles a sus sitios de reproducción y regresan cada año a la misma colonia y en algunos casos utilizan el mismo nido durante cada temporada reproductiva.

En el mar, la actividad pesquera es una de las mayores amenazas para estas especies. La sobrepesca disminuye la disponibilidad de presas y algunas aves son capturadas accidentalmente en las artes de pesca. Otras amenazas a las que se encuentran expuestas, están relacionadas con la contaminación, la introducción de especies exóticas en sus sitios de nidificación y cría y la modificación del hábitat terrestre y marino.

Por otra parte, el turismo no regulado, produce un impacto en las colonias provocando la deserción en los nidos y exponiendo a huevos y pichones ante los predadores. Los derrames de petróleo provocan mortalidades masivas en tiempos cortos.

Una de las mejores muestras del compromiso con la conservación de estas especies, es la creación de áreas marinas protegidas que tengan un estricto criterio ecosistémico y de conservación de las zonas de reproducción, cría y alimentación. En este sentido creemos que una comunidad informada y participativa será la garantía de supervivencia de las especies.

Desde el área de Educación Ambiental de la Fundación Patagonia Natural nos sentimos honrados de presentarles un material que esperamos sea incorporado al trabajo educativo en el aula, a fin de contribuir con la formación de personas capaces de tomar decisiones sobre nuestra calidad de vida y trabajar por la conservación de las especies.

Este es un trabajo coordinado y realizado por un grupo de especialistas que con un alto compromiso sostienen procesos de concientización a través del uso de la Educación Ambiental como herramienta.

José María Musmeci
Coord. General
Proy. ARG/02/G31
Fundación Patagonia Natural

Griselda Sessa
Coord. Área Educación
Proy. ARG/02/G31
Fundación Patagonia Natural

La **Fundación Patagonia Natural** es una organización no gubernamental creada en julio de 1989 con el objetivo de promover la conservación de la flora y la fauna, proteger el ambiente patagónico y propiciar el manejo responsable de sus recursos y ecosistemas.

Entre otros proyectos, de 1993 a 1996 ejecutó el “Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica” ARG/92/G31, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este marco se relevó y diagnosticó el estado de la fauna, pesca, turismo y contaminación de dicha zona, información base para elaborar una serie de recomendaciones tendientes al uso responsable de los recursos costeros. En su Primera Fase abarcó tres provincias patagónicas: Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Actualmente se está ejecutando el proyecto “Consolidación e Implementación del Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad” (ARG/02/G31 GEF/PNUD), 2ª Fase de aquella iniciativa. Se propone la continuación de las actividades iniciadas durante la primera fase, y el fortalecimiento del marco institucional que facilite una planificación a largo plazo, en base a un manejo que asegure la conservación de la biodiversidad; en el mismo sentido, se iniciaron sub-programas para estimular la adopción de prácticas productivas coherentes con la conservación; está en marcha una red de Áreas Protegidas Patagónicas; se están desarrollando programas de concientización sobre el valor de la biodiversidad marina y costera. Esta fase se implementa en las cuatro Provincias de la Patagonia, repitiendo la experiencia de la Fase Piloto en la cuarta provincia, Tierra del Fuego.

En este marco, el Área de Educación de Fundación Patagonia Natural lleva adelante diversas propuestas de capacitación destinadas a docentes, agentes de conservación, guías de turismo, así como actividades y programas en los que participan alumnos y docentes de la zona costera patagónica. Todos los participantes reciben material didáctico elaborado y distribuido desde el área.

El objetivo de las capacitaciones es generar cambios actitudinales que repercutan en la valoración y respeto por el medio ambiente, y en la incorporación de nuevas metodologías educativas.

Las propuestas apuntan a la educación en valores, y a facilitar la apropiación de saberes de una manera activa, un proceso dinámico en el que agentes de conservación, guías de turismo, docentes y alumnos participan, a través de la acción, en la construcción del conocimiento sobre el ambiente patagónico, la biodiversidad regional, sus amenazas y los problemas de conservación a los que se enfrentan diariamente.

Contenido de las Fichas de Aves marinas y playeras

Esta colección de fichas de flora y fauna de la costa patagónica está organizada en cinco secciones: mamíferos marinos, aves marinas y playeras, mamíferos terrestres, aves terrestres y de agua dulce, y flora. Las fichas constituyen una herramienta de gran utilidad para docentes, alumnos, guías de turismo, agentes de conservación y toda persona interesada en la naturaleza de la zona costera patagónica.

Las fichas de Aves Marinas y Playeras presentan 31 especies que han sido seleccionadas por ser las más fáciles de observar en toda la costa patagónica, o por ser notoriamente abundantes en alguna localidad. Otras, poco comunes, fueron elegidas en función de que su problemática de conservación necesita ser conocida.

Al inicio de esta sección el lector encontrará una **Introducción** en la que se detallan las características de las aves en general, y de las aves marinas y playeras. De este modo, se brinda información sobre sus adaptaciones anatómicas y fisiológicas, su biología reproductiva, comportamiento de alimentación, y estado de conservación. Por ser ésta una publicación de divulgación, destinada a un público muy diverso, no se incluye la clasificación sistemática de las especies.

A continuación de esa Introducción, se presenta una **Ficha** para cada una de las especies, en las que se desarrolla la siguiente información:

Nombre vulgar de la especie.

Nombre científico.

P: Indica que se trata de un ave playera

M: Indica que se trata de un ave marina

Distribución.

Se indican los límites geográficos del área donde habita la especie y su distribución detallada en la Patagonia. También se incluyen datos sobre sus movimientos migratorios.

Dimensiones.

Tamaño aproximado que el observador otorga al animal adulto en su postura más habitual. En general se refiere al largo del animal, desde el pico hasta la cola. En algunos casos se incluye también la envergadura alar (largo de las dos alas extendidas).

Peso.

Refiere el peso promedio del individuo adulto. En aquellas especies migratorias se indican algunas de las variaciones que sufren en el peso durante su viaje.

Características morfológicas.

Se mencionan las características que permiten identificar a la especie.

Comportamiento general.

Se comentan aquellos aspectos de la conducta que le son característicos.

Alimentación.

Se describe la dieta y las técnicas de alimentación utilizadas por cada especie.

Reproducción.

Informa sobre su periodo reproductivo y tiempo de incubación.

Estado de Conservación.

Se presentan los principales problemas de conservación de cada especie, y su categorización por la UICN (Union Mundial para la Naturaleza). La descripción de este sistema de categorías se encuentra al final de la sección.

Cada Ficha está ilustrada con un dibujo que permite identificar a la especie. Las ilustraciones son obra de Guillermo Harris, y fueron publicadas en: “A Guide to the Birds and Mammals of Coastal Patagonia”. Guillermo Harris. Princeton University Press, New Jersey. 1998. Este material gráfico no puede ser reproducido sin autorización expresa y escrita de su autor. La bibliografía consultada para elaborar estas fichas se menciona al final de la sección.

Características generales de las aves

Las aves son animales vertebrados fácilmente reconocibles por la presencia de plumas. Existe gran uniformidad en la estructura de las aves, a pesar de que evolucionaron durante aproximadamente 130 millones de años y se adaptaron a ecosistemas tan diferentes como bosques, desiertos, montañas, praderas y ambientes de agua dulce y salada. Probablemente la razón de esta uniformidad estructural y funcional sea que las aves han evolucionado en torno a su capacidad de vuelo, lo que restringe en gran manera su diversidad. Además de plumas, todas las aves presentan extremidades anteriores modificadas como alas (que no siempre son utilizadas para el vuelo), y todas tienen extremidades posteriores, cubiertas de escamas y, en general, con 4 dedos, adaptadas para la marcha, la natación o para posarse sobre las ramas. Todas las aves mudan sus plumas al menos una vez al año, normalmente luego de la temporada de cría. También algunas sufren una muda parcial antes de este periodo, durante la cual adquieren plumas de colores o formas diferentes, importantes para el cortejo.

El esqueleto de las aves está totalmente osificado y posee cavidades neumáticas (es decir que sus huesos son huecos, lo que hace que el esqueleto sea muy liviano). La columna vertebral de las aves está altamente especializada para el vuelo, siendo su característica más llamativa la rigidez. La mayor parte de las vértebras se fusionan entre sí y con las de los huesos de la cintura pelviana para formar un eje rígido que soporta las patas posteriores y da rigidez al ave durante el vuelo. Las costillas también se encuentran fusionadas con las vértebras, la cintura pectoral y el esternón. El esternón está provisto de una quilla, donde se anclan los músculos del vuelo. Sus mandíbulas están cubiertas por picos córneos y no poseen dientes.

En cuanto a su reproducción, son animales ovíparos, de fecundación interna, es decir, mediante cópula. El desarrollo del embrión ocurre en el huevo fuera del cuerpo de la madre, durante un periodo de incubación. Los pichones pueden ser activos en el momento de la eclosión (precociales) o estar desnudos y sin movilidad (altriciales).

Las aves acuáticas

Las aves acuáticas son aquellas que viven relacionadas a cuerpos de agua. Este grupo está conformado por **aves marinas**, **aves playeras** y **aves de agua dulce**. Esta no es una división sistemática, es decir que no respeta el grado de parentesco entre las diferentes especies. Se trata simplemente de una agrupación de especies que utilizan un mismo hábitat, y por ello comparten características comunes.

Aves marinas: son aquellas aves que **dependen exclusivamente del mar para su alimentación**. Aunque hay algunas excepciones, la mayoría de las aves de este grupo **solamente está en el continente durante su etapa reproductiva** y pasa la mayor parte de su vida alimentándose en el mar (pingüinos, gaviotas, gaviotines, cormoranes, petreles, albatros, escúas, etc).

Aves playeras: son aquellas aves acuáticas que se alimentan mayormente en la zona intermareal (las llamadas chorlitos y playeros), aunque también se las observa en lagunas de agua dulce y pastizales.

Aves de agua dulce: son aves que están generalmente asociadas a lagos, lagunas o ríos continentales. Muchas de ellas utilizan también las costas marinas (patos, cisnes, flamencos, macaes, etc).

El ambiente marino es utilizado por un grupo diverso de aves acuáticas. Sin embargo, en esta serie de fichas sólo presentaremos a las aves marinas y playeras, ya que las de agua dulce pasan la mayor parte del tiempo en ambientes continentales.

AVES MARINAS

En la costa Argentina se reproducen 17 especies de aves marinas: gaviotas, gaviotines, pingüinos, cormoranes, petreles y escúas. Además, en el Mar Argentino se alimentan cerca de 60 especies que reproducen en sitios lejanos tales como Antártida e Islas Subantárticas, Australia y Nueva Zelanda.

Son animales de vida larga, pudiendo vivir entre 20 y 60 años según la especie. Se caracterizan por su madurez retardada, es decir, su reproducción tardía. En general los juveniles tardan al menos 3 años en estar maduros sexualmente, aunque este retraso varía entre las diferentes especies, llegando a los 12 años en los albatros. Son monógamas y, en general, mantienen la misma pareja durante varios años. Se reproducen en colonias ubicadas en la costa o en islas. Son fieles a sus sitios de reproducción, regresan todos los años a la misma colonia, y en algunos casos utilizan el mismo nido cada vez. Ponen pocos huevos en comparación con las aves terrestres (de 1 a 4 según la especie) y algunas especies reproducen cada dos años. Ambos miembros de la pareja incuban los huevos y alimentan a sus pichones.

Entre sus adaptaciones al medio marino se encuentra la glándula de la sal, ubicada en las órbitas de los ojos. La misma permite eliminar del cuerpo el exceso de sal. Otra manera de limitar la cantidad de sal es alimentarse de presas con alto contenido líquido, en lugar de beber agua de mar. Presentan también una glándula uropigia en la base de la cola, la cual segrega un aceite con el cual lubrican e impermeabilizan las plumas mediante el pico. Sus patas palmadas les permiten una mejor propulsión en el agua. La mayoría de las especies de aves marinas comparte un patrón de coloración: negro en el dorso y blanco en el vientre. Esto representa una adaptación evolutiva mediante la cual el animal puede mimetizarse eficientemente en el medio marino. Cuando nada sumergido, su dorso oscuro pasa desapercibido para un predador que lo observa desde arriba, al confundirse con los tonos oscuros de las profundidades marinas, y a la inversa, su torso blanco se mezcla con la luminosidad de la superficie para el que observa desde una profundidad mayor.

Las presas más ingeridas por las aves marinas son los peces, y en menor medida los cefalópodos (calamares y pulpos) y los crustáceos (langostinos, camarones, etc). Sin embargo, algunas especies también se alimentan de pequeños organismos del fitoplancton y del zooplancton. Debido a que poseen pocos predadores y a que por su tipo de alimentación se encuentran en el nivel trófico más alto, las aves marinas son consideradas predadores tope.

Existe una gran diversidad en las formas que tienen las diferentes especies de conseguir su alimento. Algunas detectan sus presas durante el vuelo y se zambullen para atraparlas (gaviotines), otras las detectan mientras están posadas sobre la superficie del agua (gaviotas) o mientras bucean (cormoranes y pingüinos). También existen especies que roban el alimento a otras aves de la misma o de otra especie, comportamiento conocido como *cleptoparasitismo* (gaviotas, gaviotines, escúas). Algunas aves marinas predan sobre huevos y pichones de otras especies (gaviotas, escúas) o se alimentan de carroña (petrel gigante del sur). Esta diversidad en su comportamiento de alimentación se ve representada en algunas características morfológicas como la forma y el tamaño del pico y de las alas.

Si bien todas las aves marinas son coloniales, y se reproducen en la costa o en islas, cada especie selecciona ambientes con características particulares al momento de construir sus nidos. Por ejemplo, algunas construyen nidos con su propio guano, al que agregan algas para mantener fresco, en terrenos llanos, paredes de acantilados o arbustos (cormoranes). Otras, en cambio, ponen sus huevos directamente sobre la arena o el canto rodado (gaviotines), en playas abiertas, o cavan sus nidos bajo tierra (pingüinos). Ambos miembros de la pareja se ocupan del cuidado del nido y la alimentación de los pichones. En comparación con las aves terrestres, el periodo de cuidado de los pichones es largo (hasta 6 meses en algunas especies). Esto varía en función del grado de desarrollo del pichón al nacer: algunos nacen sin plu-

món y con los ojos cerrados (altriciales: cormoranes), por lo cual no pueden moverse del nido. Otros en cambio nacen con plumón, ojos abiertos, e inmediatamente pueden moverse del nido (precociales: gaviotas, gaviotines), aunque dependen de los padres para su alimentación. En general, los pichones se independizan de los padres cuando finaliza la temporada reproductiva y abandonan la colonia.

Problemas de conservación

Los principales problemas de conservación que enfrentan las aves marinas están relacionados con la modificación de su hábitat terrestre y marino (reproductivo y de alimentación). Las amenazas en tierra, durante el periodo reproductivo, están dadas por la introducción de especies exóticas en las colonias, como perros, gatos, ratas, y otros mamíferos que predan sobre adultos, pichones o huevos. También la introducción de ganado genera erosión del suelo y cambios en las comunidades vegetales que pueden afectar la calidad del hábitat de nidificación. Por otra parte, el turismo produce un alto impacto en las colonias, provocando la deserción de nidos por parte de las aves adultas, y exponiendo a huevos y pichones ante predadores.

En el mar, la actividad pesquera es la mayor amenaza para las aves marinas. Por un lado, la sobre-pesca disminuye la disponibilidad de presas, y por el otro, las aves son capturadas accidentalmente en las artes de pesca. En particular, las aves buceadoras son atrapadas en redes de arrastre, mientras que los albatros y petreles quedan enganchados al intentar comer la carnada de los palangres. Algunas especies, en particular las gaviotas, aprovechan los descartes pesqueros, obteniendo de esta manera una fuente de alimento no disponible regularmente. Esto ha favorecido al crecimiento de las poblaciones de gaviotas, lo cual se traduce en un problema para otras especies que compiten por el espacio de nidificación o que son sus presas.

La contaminación por metales pesados, organoclorados, petróleo y plástico es otro de los problemas de conservación a los que se enfrenta este grupo de aves. Es frecuente ver animales ingiriendo restos plásticos derivados de actividades pesqueras; o con sus patas, picos o alas enganchados en restos de líneas de pesca. Los derrames de petróleo pueden causar mortalidades masivas en tiempos cortos. Sin embargo, los derrames crónicos, si bien no son tan evidentes, son un problema constante. En particular, las aves que nadan o bucean están más expuestas, con un alto costo, ya que pierden la impermeabilidad de sus plumas, su protección frente a las frías aguas, lo que las obliga a salir a la costa y dejar de alimentarse.

AVES PLAYERAS

Las aves playeras son aquellas que usan mayormente las costas marinas, aunque también se puede encontrar aves playeras en costas de ríos, lagos, lagunas o en pastizales.

La mayoría de estas especies migra, y atraviesa océanos durante su viaje. En el mismo, raramente tocan el agua. Aprovechan los vientos para cubrir rápidamente grandes distancias. Durante la migración forman grandes bandadas, que vuelan a una altura de hasta 6000 m, a velocidades que alcanzan los 90 km/h.

Las aves playeras se alimentan mayormente de invertebrados: insectos, caracoles, gusanos marinos y moluscos bivalvos. Localizan a sus presas visualmente o a través del tacto, en el agua, fango o arena. Existe una gran variabilidad en la morfología del pico, lo cual permite que cada especie utilice diferentes hábitats de alimentación, que se alimente de presas de diferente tamaño o enterradas a distinta profundidad. El comportamiento de estas aves está fuertemente relacionado con el movimiento de las mareas, ya que el agua cubre sus áreas de alimentación y altera la disponibilidad de presas. Por lo tanto, las aves utilizan la zona intermareal para alimentarse durante la marea baja, y descansan en playas de arena y pastizales durante la marea alta.

Generalmente, son animales gregarios durante la etapa no reproductiva. En cambio, defienden su

propio territorio cuando se están reproduciendo. Sólo algunas especies reproducen en colonias. La mayoría de las especies son monógamas. Forman una sola pareja en la estación reproductiva (que muchas veces persiste año a año) y ambos integrantes de la misma se encargan del cuidado de los pichones. También, se ha observado la poliginia en algunas especies, como el Playero de Rabadilla Blanca. En este caso, un mismo macho copula con varias hembras durante la estación reproductiva, y sólo las hembras se ocupan del cuidado de las crías. Otras especies son poliándricas: una hembra copula con varios machos, y es éste quien se encarga de incubar los huevos y alimentar a los pichones (falaropos y jacanas). Sus nidos son simplemente un pequeño pozo en el suelo, generalmente cerca del agua, al que acondicionan con piedras, conchas marinas, pastos u hojas. Ponen entre 1 y 4 huevos. Su periodo de incubación varía entre 15 y 40 días dependiendo de la especie. Los pichones son precociales, y abandonan el nido a los dos días de nacer, para alimentarse junto a sus padres.

Los problemas de conservación que enfrentan las aves playeras no son muy diferentes a los de otras aves: degradación de hábitat, desarrollo costero, y muchos otros relacionados con el crecimiento de la población humana. De particular preocupación son las especies que reproducen en playas, donde son continuamente molestadas por el desarrollo de actividades recreativas. Incluso la basura que dejan los visitantes en la playa puede atraer a predadores de estas aves. A pesar de que muchas especies poseen grandes poblaciones, se trata de animales muy vulnerables por su comportamiento gregario. Durante la migración en la etapa no reproductiva estas aves utilizan sitios de alimentación en playas específicas, donde se congregan de a miles. El disturbio ocasionado por los turistas en las playas hace que estos individuos no puedan alimentarse, recuperar la energía gastada en el viaje, y seguir la migración hacia los sitios de reproducción. Esto se traduce en una disminución poblacional a corto plazo. Las pesquerías costeras y artesanales también afectan a estas aves al alterar el ambiente de alimentación y disminuir la disponibilidad de presas. El desarrollo urbano en las costas y la contaminación marina son dos factores importantes que condicionan la distribución y abundancia de las aves playeras, causando la pérdida de su hábitat.

Pingüino Penacho Amarillo

M

Eudyptes chrysocome

Distribución

El Pingüino Penacho Amarillo se encuentra ampliamente distribuido en islas de los océanos australes y en islas subantárticas. En la costa Argentina nidifica en Isla Pingüino (Santa Cruz), en la Isla de los Estados (Tierra del Fuego) y en Islas Malvinas.

Dimensiones

Los adultos miden 40 cm de alto.

Peso

Los adultos pesan entre 2 y 4 Kg.

Características morfológicas

Es relativamente pequeño y rechoncho. Es negro en el dorso y blanco en su zona ventral. En la cabeza presenta una capucha negra con cejas doradas que forman un penacho de largas plumas amarillas. Su pico es anaranjado-rojizo y termina en un gancho pronunciado.

Comportamiento general

Forma colonias en islas rocosas y empinadas. Puede trepar costas escarpadas ya que los dedos de las patas son flexibles para aferrarse a superficies rocosas. Salta desde la cresta de las olas para llegar a tierra y sube las pendientes avanzando con pequeños saltos.

Alimentación

Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y cefalópodos del macrozooplancton: calamares, calamaretos, pulpo colorado y larvas y juveniles de peces como sardina fueguina o bacalao austral. Durante

la incubación de los huevos y la crianza de los pichones, ambos miembros de la pareja intercambian periodos de alimentación en el mar con periodos de cuidado del nido de hasta 15 días de duración. En los primeros 20 días de vida del pichón, sólo la hembra lo alimenta, realizando viajes diarios de hasta 48 hs. Los machos pueden recorrer unos 800 km para alcanzar su alimento, mientras que las hembras realizan viajes más cortos, hasta una distancia de 360 km. Realizan buceos a profundidades promedio de 25 m, con duraciones de 70 s en los machos y 60 s en las hembras.

Reproducción

En Isla de los Estados el ciclo reproductivo comienza a fines de septiembre o principios de octubre, con la llegada de los machos a la colonia, continuando con el arribo de las hembras unos días mas tarde. El Pingüino Penacho Amarillo presenta una alta fidelidad al nido y a la pareja. Su nido es una depresión en el suelo, forrada de hierbas y piedras. La puesta de huevos se realiza a fin de octubre (2 huevos por nido), aunque generalmente un sólo pichón sobrevive y la eclosión ocurre a fines de noviembre. Los pichones son inicialmente alimentados sólo por sus madres y a medida que crecen, los



padres también realizan viajes para conseguir alimento. Mientras ambos padres se encuentran en el mar, los pichones se agrupan en “guarderías” en la playa. Alrededor de los 50 días de vida los pichones mudan para adquirir su primer plumaje juvenil. A fines de enero los adultos comienzan sus viajes de alimentación previos a la muda, que ocurrirá a fines de febrero. En marzo, los adultos dejan la colonia y comienzan su dispersión post reproductiva. La colonia de Isla Pingüino comienza su ciclo reproductivo un mes más tarde que la colonia de Isla de los Estados.

Estado de Conservación

Las principales amenazas para estas aves marinas son: la sobrepesca, la captura incidental en artes de pesca, la contaminación (especialmente por derrames de petróleo) y los disturbios ocasionados por el turismo. En el caso del Pingüino Penacho Amarillo, no existen muchos estudios acerca de cómo son afectados por estos factores. La evidencia de mortalidad incidental en pesquerías es muy fragmentaria, sólo se conocen algunos reportes de capturas en barcos de calamar. Es probable que sus hábitos alimenticios lo hagan poco proclive a ser víctima de mortalidad en pesquerías industriales. Por otro lado, en Isla Pingüino, el Pingüino Penacho Amarillo está sujeto a la actividad turística, si bien las visitas se hacen en forma controlada, el número de visitantes se ha incrementado en los últimos años. En Isla de los Estados, animales introducidos como la cabra y el ciervo colorado pisotean los pastizales costeros, modificando el hábitat de nidificación de los pingüinos. La alta dependencia de los pingüinos por estos pastizales podría hacerlos vulnerables. La UICN lo ha clasificado en el año 2008 como ***Vulnerable*** (VU). Esto se debe a que su población mundial ha disminuido un 30% en los últimos treinta años.

Pingüino de Magallanes

Spheniscus magellanicus

M

aves marinas

aves terrestres

flora

Mamíferos marinos

Mamíferos terrestres



Distribución

Existen colonias reproductivas desde el sur de Río Negro hasta Tierra del Fuego, en el Océano Atlántico, y desde el sur de Chile hasta Valparaíso, en el Océano Pacífico. Fuera de la época de reproducción, la población del Atlántico migra más de 4000 Km hacia el norte, hasta la latitud de Río de Janeiro, Brasil.

Dimensiones

Miden en promedio 44 cm de altura.

Peso

Los adultos pesan aproximadamente 4,5 Kg.

Características morfológicas

Su cabeza es negra con una franja blanca alrededor de ella. El plumaje es negro grisáceo en el dorso y blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre la cabeza y el torso. La hembra es más liviana que el macho y posee un pico más delgado. Sus alas están modificadas en aletas que utilizan para la natación.

Comportamiento general

Pueden verse solitarios o en grupos. Son veloces nadadores, bajo el agua se propulsan solamente con sus aletas. En tierra, su desplazamiento es lento. Para reconocerse entre individuos, determinar jerarquías o en confrontaciones entre dos o tres individuos, utilizan diferentes golpeteos de pico. Son monógamos y mantienen su pareja durante varias temporadas reproductivas. Para reencontrarse con ella o para defender su territorio, emiten una vocalización similar al rebuzno de un burro.

Alimentación

Sus presas principales son la anchoita y la sardina, pero también se alimentan de pejerrey, calamar y camarones. Se han registrado viajes de alimentación de 1 a 2 días de duración durante la etapa de alimentación de pichones. Durante sus viajes, realizan buceos de hasta 4,5 min, a profundidades que pueden llegar hasta los 60 m, aunque en promedio bucean entre los 10 y 20 m.

Reproducción

Anidan en colonias en la costa, seleccionando a tal fin suelos blandos donde puedan cavar sus nidos, aunque también pueden anidar bajo arbustos u otras protecciones. Las colonias son utilizadas año tras año y los animales al llegar eligen y reacondicionan las cuevas preexistentes para la nueva puesta. Si bien prefieren terrenos aptos cercanos al mar, se han encontrado nidos hasta a un kilómetro de la costa. La llegada de las aves se produce en septiembre, para preparar los nidos y realizar el apareamiento. Los machos son los primeros en arribar a la colonia. Son monógamos y mantienen a su pareja durante varias temporadas reproductivas. La puesta se efectúa en el mes de octubre y es usualmente de dos huevos. La incubación dura 42 días. Durante ese período ambos padres se turnan para cuidar el nido y alimentarse en el mar, siendo los primeros turnos de una duración de hasta dos semanas, seguidos de turnos más cortos a medida que avanza el periodo de incubación. Los pichones presentan un plumón uniforme de color gris y para el mes de febrero, luego de mudar este primer plumaje, ya son prácticamente autosuficientes. Hacia abril se completa la migración, retornando a los seis meses para recomenzar el ciclo.

Estado de Conservación

Los depredadores más importantes del Pingüino de Magallanes son la Foca Leopardo, el Petrel Gigante del Sur y la Orca. Huevos y pichones son depredados por varias especies de aves, como la Escúa, la Gaviota Cocinera, la Gaviota Austral y la Paloma Antártica. También animales terrestres como el Zorro Colorado, el Armadillo y el Zorrino aprovechan la distracción de los padres para hacerse de huevos o crías indefensas. Antes de establecerse su carácter de fauna protegida, los pingüinos eran fácil presa para los cazadores de aceite y grasa animal, si bien su tamaño, comparativamente reducido, los hacían menos atractivos que otros animales, como los lobos marinos. Igualmente se los cazó masivamente hasta bien entrado el Siglo XX.

Actualmente el Pingüino de Magallanes se encuentra afectado por las actividades de pesca comercial. Se ha registrado mortalidad incidental en la pesquería de langostino y merluza, y en pesquerías artesanales de redes en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cuanto a la actividad turística, si bien el Pingüino de Magallanes es tolerante a las visitas, no se descartan efectos negativos sobre las aves si el número de visitantes a sus colonias sigue creciendo. Por otro lado, esta especie se encuentra entre las aves marinas más afectadas por la contaminación crónica por hidrocarburos. La UICN categoriza a esta especie en el año 2008 como *Cercana a la amenaza* (NT).

Albatros Errante

M

Diomedea exulans



Distribución

Habita los océanos desde el trópico de Capricornio hasta los 60° de latitud Sur. Se reproduce en islas subantárticas. Las colonias más cercanas a la costa Argentina se encuentran en las Islas Georgias del Sur. En esta zona nidifica menos del 30% de la población mundial.

Dimensiones

Mide aproximadamente 1,30 m de largo y 3,5 m del extremo de un ala a la otra (envergadura alar). Es la más grande de las aves marinas.

Peso

Pesa aproximadamente 7 Kg.

Características morfológicas

El plumaje de las alas es blanco, con los bordes de las plumas negras. El pico es rosa pálido y las patas de color gris azulado.

Comportamiento general

Generalmente se lo observa solo o en bandadas dispersas. Planea con las alas tiesas, describiendo una trayectoria ondulada: toma altura un instante para descender hasta rasar las olas y enseguida vuela y repite el movimiento. Así, cubre grandes distancias en el mar sin acercarse a la tierra. Solamente se lo observa en tierra durante el período reproductivo.

Alimentación

Se alimenta de calamares, peces y descartes pesqueros en la plataforma continental argentina.

Reproducción

Alcanza la madurez sexual alrededor de los 10 años de edad, y se reproduce cada dos años. Es monógamo de por vida. En el caso de que un miembro de la pareja muera, el otro no se reproducirá hasta formar una nueva pareja, lo que puede tardar varios años. Construye el nido con plumas, musgo y excrementos en áreas separadas entre sí por más de 20 m. La hembra pone un único huevo blanquecino, que ambos padres incuban hasta su eclosión 80 días más tarde. Si el huevo se pierde o el pichón muere a los pocos días de nacido, es posible que regresen al año siguiente a anidar, si no, pasarán dos años hasta que lo hagan.


Estado de Conservación

La población mundial de esta especie ha disminuido un 20% en los últimos 10 años. La pesca con palanque parece ser la principal causa de su disminución y su amenaza está creciendo. La UICN la categorizó en el año 2008 como **Vulnerable** (VU). Actualmente la Argentina ha ratificado el compromiso multilateral e internacional a través del “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles” (ACAP) que procura conservar estas especies mediante la coordinación de actividades internacionales a los fines de mitigar sus amenazas.

Albatros Ceja Negra

M

Thalassarche melanophrys



Distribución

Habita los océanos meridionales, desde el trópico de Capricornio hasta los 60° de latitud Sur. Se reproduce en islas subantárticas. Las colonias más cercanas a la costa Argentina se encuentran en la Isla de los Estados e Islas Malvinas. Más del 95% de la población mundial nidifica en estas colonias.

Dimensiones

Mide 85 cm de largo y 250 cm del extremo de un ala a la otra (envergadura alar).

Peso

Llega a pesar hasta 3,8 Kg.

Características morfológicas

Es un ave robusta de color blanco, con la parte superior de las alas y el dorso negros. Posee una ceja negra muy llamativa. El pico es amarillo, con la punta rosada. Sus patas son de color gris azulado.

Comportamiento general

Se lo observa en grandes bandadas en mar abierto, lejos de la costa. Planea con las alas extendidas en forma recta. Puede recorrer grandes distancias y pasar mucho tiempo en vuelo sin posarse en el agua. Se lo puede ver volando cerca de la costa cuando el viento supera los 30 km/h. Suele seguir a los buques pesqueros durante días. Junto con la Gaviota Cocinera es la especie más común en asociación con los barcos pesqueros. Solamente está en tierra durante el periodo reproductivo.

Alimentación

Sus presas son calamares, crustáceos y peces. A veces sumerge la cabeza y parte del cuerpo en el agua para perseguirlas. Suele alimentarse junto con pardelas, gaviotas cocineras y mamíferos marinos.

Reproducción

Estas aves permanecen en las colonias de reproducción entre los meses de septiembre y abril. Hasta diciembre, ambos miembros de la pareja incuban los huevos. Los pichones aprenden a volar en el mes de mayo. Es la única especie de albatros que se reproduce anualmente, poniendo un huevo por año.

Estado de Conservación

Esta especie ha sido categorizada por la UICN en el año 2008 como *En peligro* (EN), debido a la velocidad con que sus poblaciones están disminuyendo. En las Islas Georgias del Sur han disminuido un 4% anual en los últimos 30 años, mientras que en las Islas Malvinas las poblaciones han caído un 20% en los últimos 5 años. La amenaza más importante para la especie es la mortalidad incidental en pesquerías de palangre. Actualmente la Argentina ha ratificado el compromiso multilateral e internacional a través del "Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles" (ACAP) que procura conservar estas especies mediante la coordinación de actividades internacionales a los fines de mitigar sus amenazas.

Petrel Gigante del Sur o Común

M

Macronectes giganteus

Distribución

Sus colonias de reproducción se extienden desde el sur de Chile y el sudeste de Argentina hasta la Isla Heard en el Océano Índico y el continente antártico. En Argentina, se reproduce en colonias ubicadas en Isla Arce e Isla Gran Robredo, al norte del golfo San Jorge (Chubut) y también en Isla de los Estados e Isla Observatorio.

Dimensiones

Mide 95 cm de largo, y 210 cm de la punta de un ala a la otra (envergadura alar).

Peso en adultos

Llega a pesar hasta 5 Kg.

Características morfológicas

Su cuerpo es de color negro grisáceo, y se torna gris o blancuzco en la cabeza y el cuello, acentuándose con la edad. Su pico es color amarillento verdoso, con un tubo nasal muy pronunciado. Sus patas son grises. La hembra es de menor tamaño. Los juveniles son color castaño oscuro o negros.

Comportamiento general

Se lo observa solo o en grupos. Su presencia en la costa es frecuente con vientos fuertes. Es un excelente planeador, vuela en forma ondulada sobre las olas. A menudo se posa en la costa, donde camina de forma torpe con las alas desplegadas. Es común encontrarlo en colonias de mamíferos y aves marinas, donde se alimenta de animales muertos.

Alimentación

Es un ave depredadora y carroñera. Se alimenta principalmente de calamar y restos de Pingüino de Magallanes, y en menor proporción de peces, langostinos y restos de mamíferos marinos. También se observó que consumen desechos de origen humano arrojados desde los barcos pesqueros. Durante la etapa reproductiva cada miembro de la pareja realiza viajes de alimentación de 7 días aproximadamente, a una distancia máxima de la colonia de 500 Km. En total, en un viaje de alimentación pueden recorrer 2500 Km.

Reproducción

Nidifica en colonias con características muy diferentes. En el Golfo San Jorge, los nidos se ubican sobre sustratos rocosos sin vegetación. En Isla de los Estados en cambio, los nidos se encuentran sobre turberas y pastos. En las colonias de Chubut, la puesta de los huevos ocurre a fines de octubre, y los pichones nacen a fines de diciembre. Cada pareja pone un huevo, y tanto el macho como la hembra se ocupan de su cuidado. Los adultos permanecen con el pichón dos semanas, momento a partir del cual los pichones comienzan a quedar solos mientras los padres se alimentan. Los pichones abandonan la colonia hacia fines de marzo.



Estado de Conservación

Estudios recientes indican que la población mundial del Petrel Gigante del Sur está disminuyendo en la mayoría de las colonias reproductivas, por lo cual la UICN lo ha categorizado en el año 2008 como ***Cercana a la amenaza*** (NT). La mortalidad de estas aves en pesquerías de palangre parece ser un factor importante a nivel mundial en la disminución del tamaño poblacional de esta especie. La disminución del tamaño de algunas colonias de elefantes y lobos marinos también podría estar afectando al Petrel Gigante del Sur a través de la reducción en la disponibilidad de alimento. Sin embargo, las colonias de Argentina han sufrido un aumento en su número en los últimos años. Actualmente la Argentina ha ratificado el compromiso multilateral e internacional a través del “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles” (ACAP). Este acuerdo procura conservar los albatros y petreles mediante la coordinación de actividades internacionales a los fines de mitigar sus amenazas.

Puffinus griseus

Distribución

Sus colonias de reproducción se encuentran en las Islas Malvinas e islas cercanas al Cabo de Hornos, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Al finalizar su etapa reproductiva migra por los Océanos Atlántico y Pacífico hacia el Hemisferio Norte.

Dimensiones

Mide 45 cm de largo, y 95 cm de la punta de un ala a la otra (envergadura alar).

Peso

Su peso varía entre 650 y 950 g.

Características morfológicas

Es de color pardo, con una zona plateada debajo de las alas. Sus alas son largas y angostas. Posee un pico negro largo y delgado. Sus patas son negras.

Comportamiento general

Se la observa en bandadas muy numerosas y dispersas, muchos kilómetros mar adentro. Planea siguiendo una trayectoria ondulada, ágil y rápida.

Alimentación

Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos que captura en la superficie del agua. Es común verla junto a gaviotas, gaviotines y albatros alimentándose de cardúmenes que han sido arreados por delfines o cormoranes.

Reproducción

La reproducción comienza con la llegada de las aves a las colonias entre septiembre y noviembre. Cada pareja pone un solo huevo. La puesta ocurre entre noviembre y diciembre y los pichones abandonan la colonia entre marzo y mayo. Arman sus nidos en cuevas que excavan ellas mismas, en terrenos blandos y que cubren con plantas. Los nidos son visitados por la noche para evitar la predación.

Estado de Conservación

A pesar de que la población mundial es numerosa, se ha observado una gran disminución en su número por causas que no son comprendidas totalmente. La UICN la ha categorizado en el año 2008 como *Cercana a la amenaza* (NT).



Pardela de Cabeza Negra

M

Puffinus gravis

Distribución

Se reproduce en las Islas Malvinas y Tristan de Cunha. Luego migra hacia el Ártico por el Océano Atlántico.

Dimensiones

Mide 44 cm de largo y 1,10 m de la punta de un ala a la otra (envergadura alar).

Peso

Pesa aproximadamente 900 g.

Características morfológicas

La frente, corona, nuca y zona debajo de los ojos son de color café, formando un capuchón en la cabeza. El resto de la cabeza y cuello son blancos. Las plumas del dorso son marrones y el vientre es blanco. Las patas son azuladas.

Comportamiento general

Se la observa en bandadas, junto a otras especies de pardelas y petreles. Es común verla asociada a grupos de delfines alimentándose. Vuela por largos periodos con vientos fuertes, con aleteos rápidos hacia arriba y abajo.

Alimentación

Se alimenta principalmente de peces, calamares y descartes pesqueros. Detecta a sus presas desde el aire, se apoya en el agua y luego bucea para atraparlas.

Reproducción

Llega a las colonias reproductivas en el mes de septiembre. Cada pareja pone un huevo en el mes de noviembre, y finalmente, los pichones abandonan el nido en mayo. Nidifica en terrenos con pendiente, en zonas con pastos.

Estado de Conservación

Si bien sus tendencias poblacionales no han sido cuantificadas, las condiciones actuales no harían pensar que su población esté en riesgo de disminuir. Por esta razón, la UICN ha categorizado a esta especie en el año 2008 como de **Preocupación menor** (LC)



Phalacrocorax olivaceus***Distribución***

Es una especie ampliamente distribuida en la Región Neotropical. Se la encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos, en ambientes marinos y de agua dulce.

Dimensiones

Su largo es de alrededor de 73 cm.

Peso

Pesa entre 1 y 1,5 Kg.

Características morfológicas

Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Es monógamo y procrea en colonias. En tierra es común verlo posado en ramas o rocas, con sus alas extendidas secándose al sol. Nada con el cuerpo semi-sumergido, a veces con la cabeza bajo el agua. Su vuelo es bajo y recto, con aleteos rápidos.

Comportamiento general

Su plumaje es negro, y posee un cuello y cola largos. Sus ojos son verdes y el pico azulado. Durante la etapa reproductiva posee un jaspeado blanco detrás del ojo y una banda de plumas blancas en el borde de la garganta.

Alimentación

Sus principales presas son peces que se desplazan en cardúmenes cerca de la superficie, como el peje-rey y el róbalo. Captura sus presas en forma individual o en bandadas. Se alimenta principalmente en aguas costeras y de poca profundidad. Realiza buceos de corta duración (18 s en promedio) y permanece en la superficie, entre buceos consecutivos, alrededor de 7 s.

Reproducción

Sus nidos son plataformas construidas con ramas, con una depresión en el centro, generalmente sobre arbustos. Dependiendo de la colonia, la puesta de los huevos puede realizarse en uno o varios periodos del año. En general, ocurre entre octubre y enero. Usualmente pone 3 huevos que son incubados por ambos miembros de la pareja durante aproximadamente 27 días. Luego, ambos padres alimentan a los pichones por alrededor de 11 semanas.

Estado de Conservación

Se estima que a nivel global, su población actual es de aproximadamente 2.000.000 de individuos. La población reproductiva estimada para la costa patagónica es de 1200 parejas. Actualmente el Biguá no se encuentra bajo ningún tipo de explotación que pueda afectar directamente a sus poblaciones. La UICN lo ha categorizado en el año 2008 como de **Preocupación menor** (LC). Sin embargo, como toda ave marina está expuesta a la contaminación por hidrocarburos, a la captura incidental en artes de pesca y al disturbio ocasionado por el turismo en sus colonias.



Cormorán Gris

M

Phalacrocorax gaimardi

Distribución

Nidifica a lo largo del Océano Pacífico, desde Perú hasta el sur de Chile. En Argentina, se lo encuentra solamente en la costa de Santa Cruz.

Dimensiones

Mide aproximadamente 60 cm de largo.

Peso

Pesa aproximadamente 1,4 Kg.

Características morfológicas

Su plumaje es gris azulado en el dorso y su vientre blanco. Posee manchas blancas en las alas y a los costados del cuello. Sus ojos son verdes y alrededor de ellos posee unos anillos de color celeste. Su pico es amarillo con la base roja. Las patas son de color rojo coral. Los juveniles son grises sin manchas blancas.

Comportamiento general

Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Vuela recto y bajo, con aleteos rápidos. Nidifica sobre paredes de acantilados rocosos de elevada pendiente, tanto en islas como en el continente. A diferencia de la mayoría de las aves marinas, y al igual que el Cormorán Cuello Negro, permanece todo el año en la colonia, siendo escasa su dispersión post reproductiva.

Alimentación

Se alimenta principalmente de poliquetos, crustáceos, peces bentónicos y peces pelágicos como la sardina fueguina. Durante la etapa reproductiva realiza en promedio cuatro viajes de alimentación por día, de 1 a 2 hs de duración. Durante estos viajes llevan a cabo una serie ininterrumpida de buceos cortos (26 s) seguidos por intervalos de recuperación en superficie de menor duración (9 s). Se alimentan en áreas muy cercanas a la costa (menos de 1 Km) y de baja profundidad (menor a 5 m).

Reproducción

Las colonias de esta especie se ubican muchas veces junto a las del Cormorán Cuello Negro. Construyen sus nidos sobre los restos de guano del nido utilizado en la temporada anterior, al que acondicionan con plumas, algas y ramas de arbustos. La puesta de los huevos comienza en octubre. Cada pareja pone en



promedio 3 huevos que incuba durante aproximadamente un mes. El tamaño de la nidada es mayor que en otros cormoranes, como el Cormorán Cuello Negro o el Imperial, ya que se ha observado un alto porcentaje de nidos con 4 huevos. Tanto durante la etapa de incubación, como durante la crianza de pichones, ambos miembros de la pareja alternan periodos de alimentación en el mar con periodos de cuidado del nido. Los pichones se independizan de sus padres hacia fines de enero.

Estado de Conservación

La población total en Argentina de esta especie es de tan sólo 1100 parejas, siendo sus colonias muy pequeñas (menores a 600 parejas). Si bien actualmente no existen estimaciones de mortalidad asociada a actividades humanas, como la pesca o la extracción y transporte de hidrocarburos, es importante destacar que algunas colonias han disminuido su tamaño. En particular la colonia de La Mina (al sur de Santa Cruz), que alberga el 50% de la población argentina, ha disminuido su tamaño considerablemente en las últimas décadas. En el año 2008 la UICN ha categorizado a esta especie como *Cercana a la amenaza (NT)*.

Cormorán Cuello Negro

M

Phalacrocorax magellanicus

Distribución

El Cormorán Cuello Negro es una especie endémica de Argentina y Chile. Nidifica en la costa atlántica desde la Península Valdés hasta el Canal de Beagle, incluyendo las Islas Malvinas. En el Pacífico, se lo encuentra desde Valparaíso hasta el sur de Chile.

Dimensiones

Mide 68 cm de largo.

Peso

Pesa 1,5 Kg.

Características morfológicas

Su plumaje es negro, con la parte inferior del pecho y abdomen blancos. Los lados de la cabeza están jaspeados de blanco. Su garganta es blanca y está separada del vientre por una franja negra. Posee un anillo rojo alrededor del ojo. Las patas son negras. Los juveniles son pardos con el vientre manchado de blanco.

Comportamiento general

Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Es monógamo y procrea en colonias. A diferencia de la mayoría de las aves marinas que se dispersan una vez terminada la época reproductiva, esta especie permanece en la colonia durante todo el año. Sus colonias se ubican sobre paredes de acantilados o en islas rocosas con elevada pendiente. En muchos casos reproduce junto al Cormorán Imperial o al Cormorán Gris. Su vuelo es recto y bajo, con un rápido aleteo.

Alimentación

Se alimenta en aguas de profundidades menores a 10 m y a menos de 5 Km de la costa, en áreas cercanas a sus colonias. Sus presas son peces y poliquetos (gusanos marinos) que habitan en el fondo del mar. Realiza viajes de alimentación de 2 a 3 horas de duración, en los cuales alterna buceos que duran aproximadamente 50 s, con periodos en superficie de entre 14 y 18 s.

Reproducción

Si bien los adultos permanecen todo el año en la colonia, comienzan a construir sus nidos en octubre. Los mismos poseen una base de guano y son acondicionados con algas. La puesta de los huevos se inicia entre fines de octubre y principios de noviembre en forma asincrónica en la colonia, extendiéndose por casi 12 semanas. El tamaño de la nidada es de 2 a 3 huevos que son incubados durante 30 días aproximadamente. Luego, los pichones son alimentados durante casi dos meses. Ambos miembros de la pareja incuban los huevos y alimentan a los pichones, alternando periodos en la colonia con periodos de alimentación en el mar. Es importante la pérdida de huevos y pichones ya que suelen caerse de los nidos, contruidos en las paredes de los acantilados. Se han observado casos de reposición de la nidada luego de estos eventos. Sin embargo, en la mayoría de los nidos, solamente un pichón sobrevive.

Estado de Conservación

Su población reproductiva ha permanecido relativamente estable durante los últimos 15 años y no está sujeta a ningún tipo de explotación. Al depender para su alimentación y reproducción de ambientes netamente costeros, su mayor amenaza son las actividades de desarrollo costero que generan modificaciones en su hábitat. La UICN lo ha categorizado en el año 2008 como de **Preocupación menor (LC)**.



Cormorán Imperial

M

Phalacrocorax atriceps



Distribución

Esta especie se distribuye en la costa Argentina entre Punta León (Chubut) y el Canal de Beagle. También en la Isla Victoria (Lago Nahuel Huapi, Bariloche), Islas Malvinas, Antártida e islas Subantárticas. En Chile se la encuentra en la isla de Chiloé.

Dimensiones

Mide aproximadamente 75 cm de largo.

Peso

Pesa alrededor de 2,2 Kg.

Características morfológicas

Existen dos subespecies: *Ph. atriceps atriceps* y *Ph. atriceps albiventer*. En las dos, el plumaje dorsal es negro y el ventral, incluidos la garganta y el cuello, es blanco. Se diferencian en que las manchas blancas del costado de la cabeza son más grandes en *Ph. atriceps atriceps*, llegando hasta los ojos. Esta subespecie también presenta una mancha blanca en el dorso. Ambas poseen una cresta sobre la cabeza y una carúncula amarilla (engrosamiento de la piel) sobre el pico. Los ojos son pardos rodeados por un anillo azul. El pico es gris parduzco y las patas color piel. Durante el invierno, la cresta se hace menos evidente y la carúncula y los anillos oculares son de color apagado. El plumaje de los juveniles es pardo grisáceo y no poseen cresta ni carúncula.

Comportamiento general

Es un ave marina buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas. Es monógamo y procrea en grandes colonias, de hasta 5000 parejas. Al terminar la etapa reproductiva abandona la colonia y se dispersa, habiéndose identificado individuos en las costas de Uruguay. Es común observarlos en grandes grupos durante el invierno, en sitios de la costa que utilizan como dormideros. Su vuelo es recto, con aleteos rápidos. “Corren” sobre el agua antes de levantar vuelo.

Alimentación

Es una especie prácticamente piscívora, aunque también se alimenta de invertebrados como gusanos marinos, crustáceos y cefalópodos. A diferencia del Cormorán Cuello Negro, esta especie consume una mayor proporción de peces pelágicos como anchoita, merluza y pejerrey. Se alimenta tanto en zonas costeras de poca profundidad como en aguas profundas (aproximadamente 70 m) y alejadas de la costa. Durante la temporada reproductiva realiza entre uno y dos viajes de alimentación por día, en los cuales bucea ininterrumpidamente. La duración promedio de los buceos es de 100 s y la de los intervalos de recuperación en superficie es de 163 s.

Reproducción

Sus colonias se ubican en zonas costeras o islas con poca pendiente. Muchas veces reproduce junto al Cormorán Cuello Negro. Construye su nido sobre los restos del nido utilizado en la temporada anterior, al que acondiciona con plumas, algas y ramas de arbustos que cementa con su propio guano. La puesta se inicia entre mediados de octubre y fines de noviembre, aunque pueden registrarse puestas en diciembre en las colonias ubicadas en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cada pareja pone entre 2 y 3 huevos, que incuba durante 28 días. Ambos miembros de la pareja alternan periodos de alimentación en el mar con periodos de cuidado del nido. Los pichones se independizan de sus padres a los 90 días de nacer. Es común ver durante este periodo agrupaciones de juveniles en la playa aguardando la llegada de sus padres con alimento.

Estado de Conservación

Actualmente los cormoranes patagónicos no se encuentran bajo ningún tipo de explotación sistemática que pueda afectar directamente a sus poblaciones. Sin embargo, el Cormorán Imperial ha sido el principal productor de guano de la Patagonia. Esta actividad, que ha tenido efectos negativos en algunas colonias de Chubut, aún se realiza en forma manual y discontinua en unas pocas colonias, aunque con normativas adecuadas y sin efecto aparente sobre las poblaciones. Por sus hábitos buceadores es común la mortalidad incidental en la pesquería de langostino y merluza. También es importante el impacto de la contaminación por hidrocarburos y el efecto de los disturbios ocasionados por la actividad turística en sus colonias. La misma ocasiona el abandono de los nidos y la consecuente predación de los huevos por otras aves como la Gaviota Cocinera. Debido a que no se han registrado cambios importantes en su tamaño poblacional a nivel global, esta especie ha sido categorizada por la UICN en el año 2008 como de *Preocupación menor (LC)*.

Haematopus palliatus

Distribución

Se distribuye en toda la costa de América del Sur, hasta América del Norte.

Dimensiones

Mide 40 cm aproximadamente.

Peso

Su peso oscila entre 400 y 700 g.

Características morfológicas

Su cabeza y pecho son de color negro. El dorso es pardo oscuro y tiene el vientre blanco. Posee un anillo de color rojo alrededor de sus ojos amarillos. El pico es rojo. Cuando vuela, se observa una banda blanca en la parte dorsal de las alas.

Comportamiento general

Viven en parejas o en grupos familiares. Durante la etapa no reproductiva se lo observa en bandadas en la costa. Durante la época reproductiva es muy territorial. Cada pareja ocupa una sección de la playa y emite un llamado de alerta ante un eventual peligro. Su canto es fuerte, largo y aflautado.

Alimentación

Se alimenta de moluscos, cangrejos, camarones, gusanos marinos e insectos que encuentra en las zonas rocosas del intermareal.

Reproducción

Nidifica en la playa, a poca distancia de la línea de alta marea. Sus nidos son simplemente una excavación poco profunda en la grava. Pone dos huevos que se mimetizan con las piedras. Generalmente nace un solo pichón, que abandona el nido al poco tiempo de nacer. Suele reproducir varias veces durante la temporada.

Estado de Conservación

Debido a que no se han observado cambios importantes en la población de esta especie, el Ostrero Común ha sido categorizado por la UICN en el año 2008 como de **Preocupación menor** (LC).



Ostrera Austral o del Sur

P

Haematopus leucopodus



Distribución

Habita en la costa patagónica, desde Tierra del Fuego hasta la Península Valdés, en Chubut. En temporada reproductiva su distribución se restringe a zonas más húmedas de la estepa abierta, desde Islas Malvinas, Tierra del Fuego y el sur de la Patagonia hasta el noroeste de Santa Cruz.

Dimensiones

Mide 40 cm aproximadamente.

Peso

Pesa aproximadamente 615 g.

Características morfológicas

Posee la cabeza, el pecho y el dorso del cuerpo de color negro. Su abdomen, vientre y el borde de las alas son de color blanco. El pico es largo, comprimido de lado a lado, de color rojo vivo. Los ojos y anillos oculares son amarillos. La cola es blanca, terminada en una ancha banda negra. Las patas son de color blanco-rosado.

Comportamiento general

Vive en pareja o en grupos familiares. Suele formar grandes bandadas de aves no reproductoras en la costa. Durante el despegue, corre por la playa con el pico apuntando al suelo y la cola erguida. Su canto es inconfundible, compuesto por silbidos agudos y de largo alcance.

Alimentación

En la estepa utiliza el pico para hurgar la tierra húmeda en busca de invertebrados, y en las costas marinas recorre las rocas, restingas y playas en busca de moluscos y otros invertebrados de los que se alimenta.

Reproducción

Nidifica en la estepa, hasta 350 km de distancia del mar, en zonas abiertas. Por lo general, cerca del agua, hace un nido de pastos entrelazados sobre el suelo. Pone dos huevos verdes y manchados.

Estado de Conservación

Esta especie tiene un amplio rango de distribución y no se han observado cambios importantes en su distribución y tamaño poblacional. La UICN en el año 2008 la ha categorizado como de **Preocupación menor** (LC).

Haematopus ater

Distribución

Su hábitat se restringe a costas rocosas, islas y restingas desde Tierra del Fuego hasta Península Valdés por el océano Atlántico y hasta Perú, por el océano Pacífico.

Dimensiones

Mide 45 cm aproximadamente.

Peso

Su peso varía entre 500 y 700 g.

Características morfológicas

Su cuerpo es de color negro, más apagado en el dorso. Su pico es corto, de color rojo brillante. Los ojos son amarillos y los anillos oculares son de color rojo.

Comportamiento general

Vive en pareja o en grupos familiares. Es confiado, especialmente en época de cría. Permanece inmóvil o camina rápidamente con la cabeza gacha, luego levanta vuelo emitiendo un fuerte llamado. Produce un silbido típico y musical.

Alimentación

Se alimenta de lapas, que arranca de las rocas con su pico en forma de cuchillo. La dieta incluye además otros moluscos, peces, cangrejos y caracoles.

Reproducción

Nidifica en la playa, excavando un pozo a poca profundidad y a escasos metros de la línea de marea. Pone dos huevos muy manchados de color verde y pardo.

Estado de Conservación

Esta especie tiene un amplio rango de distribución y no se han observado cambios importantes en su distribución y tamaño poblacional. La UICN en el año 2008 la ha categorizado como de ***Preocupación menor*** (LC).



Charla Cabezón

P

Oreopholus ruficollis

Distribución

Se reproduce en la Patagonia y el oeste de América del Sur desde Argentina hasta Ecuador. Entre abril y septiembre migra al norte de Argentina y Uruguay.

Dimensiones

Mide 25 cm aproximadamente.

Peso

Pesa aproximadamente 140 g.

Características morfológicas

Es un ave pequeña de color grisáceo. El dorso está manchado de negro y pardo, posee una mancha negra en el abdomen. Su garganta es rojiza. Presenta una línea negra a la altura del ojo. El pico es largo y negro.

Comportamiento general

Se lo observa solo o en bandadas pequeñas. Es muy confiado. Se lo encuentra en terrenos abiertos y áridos, áreas de monte bajo o pastizales, y costados de los caminos. No está asociado a ambientes acuáticos. Suele posarse en terraplenes. Su vuelo es veloz. Al volar, emite dos o tres silbidos muy característicos.

Alimentación

Se alimenta de escarabajos, arañas, langostas, lombrices y larvas.

Reproducción

Su nido es una excavación poco profunda en el suelo. Pone tres huevos pardos con motas negras. Los pichones abandonan el nido luego de la eclosión.

Estado de Conservación

Debido a que no se han observado cambios importantes en su población, esta especie ha sido categorizada por la UICN en el año 2008 como de **Preocupación menor** (LC).



Charlita Doble Collar

P

Charadrius falklandicus

Distribución

Es una especie endémica de América del Sur. Habita en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Islas Malvinas. En invierno migra por el Pacífico y el Atlántico, llega hasta el centro y norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil.

Dimensiones

Mide 16 cm aproximadamente.

Peso

Su peso es de 60 g.

Características morfológicas

Es un ave pequeña, de pico negro corto y patas negras. El dorso es color pardo y su frente blanca. Tiene dos bandas pectorales pardo-grisáceas (de ahí su nombre: “doble collar”) a veces incompletas. La cola es negruzca con las plumas externas blancas.

Comportamiento general

Es un ave fácil de observar en costas de mar, lagunas y bañados, pero no se la suele ver dentro del agua. Es confiado, y se desplaza por medio de carreritas cortas. A pesar de tener un vuelo muy ágil, ante el peligro se desplaza corriendo. En otoño e invierno se lo observa en bandadas de cientos de individuos.

Alimentación


Se alimenta de invertebrados tales como insectos, crustáceos y gusanos marinos, que encuentra en las zonas costeras donde habita. Mientras se alimenta alterna carreritas con picoteos en superficie, deteniéndose bruscamente.

Reproducción

Nidifica en primavera desde Córdoba y Buenos Aires a Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En estos momentos suele vérselo en parejas. Se reproduce en pastizales húmedos y costas de lagunas, ríos y arroyos, excavando un pozo poco profundo donde pone tres huevos oliváceos con pintitas castañas.

Estado de Conservación

La UICN ubica a esta especie, en el año 2008, dentro de la categoría *Preocupación menor* (LC) debido a que no se han observado cambios importantes en su distribución y tamaño poblacional.



Charlita Cenicienta

P

Pluvianellus socialis



Distribución

Su área de distribución está restringida al sur de Chile y Argentina, es una especie exclusiva de Sudamérica.

Dimensiones

Mide aproximadamente 18 cm.

Peso

Pesa 75 g.

Características morfológicas

A simple vista, su aspecto general recuerda a una paloma. Posee la cabeza, pecho y partes superiores de color gris ceniciento, con el vientre y abdomen blancos. Sus ojos son rojos y las patas son cortas, de color rosado. El pico es corto y puntiagudo, de color negro.

Comportamiento general

Se lo encuentra solo o en grupos reducidos. Camina lentamente en línea recta mientras escarba en el suelo girando sobre sí mismo. Suele emitir un suave silbido al que por lo general responden los otros miembros de la bandada. Parte de la población inverna en la costa marina patagónica luego de la temporada reproductiva, y el resto migra hacia el norte hasta la costa de Río Negro, llegando ocasionalmente hasta la provincia de Buenos Aires.

Alimentación

Se alimenta de pequeños invertebrados (gusanos marinos, insectos, arácnidos, etc.) que toma del suelo o de abajo de las piedras.

Reproducción

Se reproduce en Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz. Nidifica entre octubre y diciembre. Su nido es una pequeña excavación en el pedregullo de las riberas de lagos y lagunas en la parte más austral de la estepa patagónica. Pone dos huevos de color pardo, jaspeados.

Estado de Conservación

La UICN, en el año 2008, colocó a esta especie dentro de la categoría **Cercana a la amenaza** (NT) debido a su pequeño tamaño poblacional. Si bien no están claras las causas de este fenómeno, es posible que la degradación de los pastizales patagónicos por la introducción del ganado haya producido un fuerte impacto en su hábitat reproductivo.

Playero Blanco

P

Calidris alba



Distribución

Es un ave migratoria de larga distancia. Cosmopolita. Se lo suele observar en playas arenosas o de restingas. Es más abundante en la costa del Pacífico, con mayores concentraciones en Perú. Entre septiembre y abril migra desde el Ártico hasta Tierra del Fuego, por el Océano Atlántico. Algunas bandadas permanecen en la Patagonia todo el año.

Dimensiones

Mide 17 cm aproximadamente.

Peso

Pesa aproximadamente 60 g.

Características morfológicas

Es pequeño, con el pico corto y recto, de color negro. Las patas son de color negro. El plumaje no reproductivo (el único que se observa en la Patagonia) muestra un dorso grisáceo con pequeñas rayas pardas. Los lados de la cabeza y las partes inferiores del pecho y vientre son blancos.

Comportamiento general

Es muy activo. Vuela en bandadas muy compactas rotando el cuerpo, mostrando el color gris y blanco. Llama la atención la banda alar blanca durante el vuelo. Una conducta típica es la de correr asociados a los movimientos de las olas, en búsqueda de alimento que queda expuesto cuando se retira el agua.

Alimentación

Se alimenta de pequeños bivalvos, crustáceos y gusanos marinos.

Reproducción

Se reproduce en el sector norte del círculo Polar Ártico. La puesta de huevos ocurre en junio. La hembra pone dos huevos y uno de ellos es incubado por el macho.

Estado de Conservación

Debido a que esta especie está ampliamente distribuida y que no se han observado grandes cambios en su tamaño poblacional, la UICN la categorizó, en el año 2008, como de **Preocupación menor** (LC).

Playero Rojizo

P

Calidris canutus

Distribución

Existen varias subespecies, todas migradoras de larga distancia. La subespecie *Calidris canutus rufa* se observa a lo largo de toda América durante los movimientos migratorios, desde la tundra de América del Norte, donde se reproduce, hasta Tierra del Fuego.

Dimensiones

Mide entre 23 y 25 cm aproximadamente.

Peso

Pesa aproximadamente 135 g.

Características morfológicas

Su aspecto es robusto. Su pico es recto y negro. El cuello y las patas son relativamente cortas para un playero. El color general es grisáceo con estrías rojizas o canela en el dorso. El vientre y abdomen son blanquecinos y sus patas son verdosas.

Comportamiento general

Es altamente gregario y pasivo. Se reproduce en la tundra de América del Norte y migra hasta Tierra del Fuego durante el invierno Ártico. A lo largo de esta migración realiza distintas paradas de alimentación en la costa atlántica. La primera parada es en las costas de Canadá y EEUU, luego se detiene en Surinam y desde allí se dirige hasta Tierra del Fuego. Allí pasan el verano austral desde principios de septiembre hasta finales de febrero, concentrándose básicamente en Bahía San Sebastián y Río Grande (Argentina) y Bahía Loma (Chile). En el vuelo hacia el norte, realiza paradas en los golfos norpatagónicos (Península Valdés y San Antonio Oeste) pasando por algunos lugares de Brasil (Río Grande do Sul) y desde allí recorre unos 8000 Km hasta la Bahía Delaware (EEUU), siendo esta la parada previa a la llegada a los sitios de cría.

Alimentación

Se alimenta de pequeños invertebrados que viven en los intermareales moluscos, crustáceos y poliquetos. Su dieta depende de la oferta en cada una de las paradas a lo largo de la migración.

Reproducción

Construye nidos en el suelo con forma de copa y lo acondiciona con hojas secas y líquenes. Usualmente pone 4 huevos de color verdoso con puntos oscuros.

Estado de Conservación

Durante los últimos años se ha observado una disminución de hasta el 50% en el número de individuos de las poblaciones que migran al hemisferio sur. La UICN clasifica a esta especie dentro de la categoría **Preocupación menor** (LC) en el año 2008.



Playero Rabadilla Blanca

P

Calidris fuscicollis

Distribución

Es un migrador de largo alcance, realiza vuelos de hasta 4000 km sobre el Atlántico sin detenerse. Se lo observa entre fines de agosto y abril en Uruguay y Argentina hasta Tierra del fuego. Se lo encuentra en una gran variedad de hábitats, incluyendo playas marinas, pastizales inundados, charcas y lagunas.

Dimensiones

Mide de 15 a 18 cm.

Peso

Su peso promedio es de 36 g.

Características morfológicas

Es pequeño, tiene una banda blanca sobre las plumas de la cola (rabadilla) visible durante el vuelo. Su dorso es pardo con el pecho estriado y el vientre blanco. El pico y las patas son negros y sus alas son muy largas.

Comportamiento general

Es muy activo, camina y picotea casi constantemente en el barro. Forma grandes bandadas, a menudo junto a otros chorlos.

Alimentación


Se alimenta de gusanos marinos y pequeños caracoles y crustáceos.

Reproducción

Nidifica en la tundra Ártica. Los machos son poligínicos, es decir, copulan con varias hembras. Las hembras abandonan los sitios de reproducción luego de la puesta de huevos.

Estado de Conservación

Debido a que no se han observado cambios importantes en el tamaño poblacional de esta especie, la UICN incluye al Playero de Rabadilla Blanca dentro de la categoría **Preocupación menor** (LC) en el año 2008.



Playerita Trinador

P

Numenius phaeopus



Distribución

Es un ave migradora que se reproduce en Alaska y el Norte de Canadá. Se desplaza a la Patagonia entre septiembre y marzo.

Dimensiones

Mide aproximadamente unos 43 cm.

Peso

Los adultos pesan entre 310 y 490 g.

Características morfológicas

Es un chorlo grande. Tiene el pico muy largo y curvado hacia abajo. El dorso del cuerpo es de color pardo grisáceo con manchas y estrías de color crema pálido. La parte ventral es blanquecina con estrías grises en el cuello y el pecho. Tiene unas largas cejas pálidas. Las patas son grisáceas.

Comportamiento general

Es común observarlo solo o en pequeñas bandadas, en el borde de las playas u otros cuerpos de agua. Todas las aves de la bandada despegan juntas y vuelan en grupos compactos. Emite un fuerte pero breve silbido musical.

Alimentación

Se alimenta hurgando con el largo pico en la playa, de pequeños moluscos, crustáceos o gusanos marinos.

Reproducción

Se reproduce en el Hemisferio Norte. Construye nidos poco profundos sobre el suelo y ocasionalmente los acondicionan con hojas. Pone entre 2 y 5 huevos de color verde azulados.

Estado de Conservación

La UICN ubica a esta especie, en el año 2008, dentro de la categoría **Preocupación menor** (LC) ya que posee un amplio rango de distribución y su tamaño poblacional no ha sufrido grandes cambios.

Limosa haemastica

Distribución

Posee una amplia distribución, ya que migra grandes distancias. Se reproduce en Alaska y Canadá, y entre septiembre y marzo migra hacia Tierra del Fuego. Algunas aves no reproductoras suelen quedarse todo el año en la Patagonia. Se la observa en playas abiertas y fangosas en costas marinas y a orillas de lagos, lagunas y charcos.

Dimensiones

La longitud entre la cabeza y la cola varía entre los 33 y 42 cm.

Peso en adultos

Pesa entre 196 y 358 g.

Características morfológicas

Es un chorlo grande con pico largo, delgado y levemente curvado hacia arriba, de color rojizo en la base y punta negra. Sus patas largas, grises o de color azul grisáceo, le permiten alimentarse en aguas someras. En vuelo son visibles su rabadilla (banda en la zona superior de la cola) y banda alar color blancas. Las cejas y la parte inferior del cuerpo son blancas.

Comportamiento general

Es un ave tímida. Comúnmente se la encuentra junto con grandes bandadas de chorlos rojizos. Suele observársela nadando. Cuando levanta vuelo emite un silbido característico.

Alimentación

Se alimenta de insectos, gusanos, crustáceos y moluscos mientras camina a orillas del agua y hurga la arena con su pico.

Reproducción

Nidifica en Alaska y Canadá en la tundra Ártica. Anida en zonas húmedas, pantanosas, cerca de aguas abiertas y en estuarios.

Estado de Conservación

La UICN ha categorizado a esta especie en el año 2008, dentro de la categoría **Preocupación menor** (LC) ya que posee un amplio rango de distribución y su tamaño poblacional no ha sufrido grandes cambios.



Paloma Antártica

P

Chionis alba

Distribución

Se reproduce en Islas Subantárticas y en la Península Antártica. Al finalizar la reproducción los adultos se dispersan, y los juveniles migran hacia el norte. Se los puede observar en las Islas Malvinas y la Patagonia.

Dimensiones

Mide 40 cm de largo.

Peso

Su peso oscila entre 500 y 800g.

Características morfológicas

Es un ave rechoncha, completamente blanca. Es parecida a una paloma, aunque no está emparentada con ella. Sus alas son redondeadas. Posee un pico corto y cónico, amarillento, recubierto de una vaina en la base. Sus patas son de color hueso.

Comportamiento general

Aunque puede nadar, raramente lo hace. Se la observa en bandadas pequeñas y dispersas en colonias de aves y mamíferos marinos, donde consigue su alimento. Es muy confiada y silenciosa.

Alimentación

Recorre colonias de aves, donde roba huevos, y apostaderos de mamíferos marinos, donde busca restos de alimentos entre los excrementos. También se alimenta de moluscos, crustáceos y peces.

Reproducción

Construye sus nidos en cavidades bajo piedras grandes, que acondiciona con plumas. En general cada pareja pone 2 huevos en diciembre. Los pichones nacen los primeros días de enero.

Estado de Conservación

La población total de esta especie se estima en 20.000 individuos. Existen evidencias de que el número de individuos que habita en las islas argentinas del Atlántico Sur ha disminuido. Sin embargo, el número total de individuos a nivel global parece mantenerse estable, por lo que la UICN la ha categorizado en el año 2008 como de **Preocupación menor** (LC).



Catharacta antarctica

Distribución

Se distribuye en los océanos australes, incluso en Antártida. En Argentina, se han registrado colonias reproductivas en las costas de Chubut y Santa Cruz, desde Punta Tombo hasta Punta Sur. También en las Islas Malvinas.

Dimensiones

Mide 55 cm.

Peso

Su peso varía entre 1,2 y 2 Kg.

Características morfológicas

Su cuerpo es de color pardo, con el vientre más claro que el dorso. Cuando vuela se observa una mancha blanca en la base de las plumas de las alas.

Comportamiento general

Se lo observa solo o en parejas. Su vuelo es potente y veloz. Suele atacar a quienes se acercan al nido. Persigue a gaviotas y gaviotines para robarles su alimento.

Alimentación

Utiliza la técnica del cleptoparasitismo, es decir, persigue a otras aves, en especial gaviotas y gaviotines, hasta que éstas dejan caer el alimento que llevan en el pico (peces y huevos generalmente) y lo toma antes de que llegue al piso. También predica directamente sobre huevos y pichones de otras aves y consume carroña.

Reproducción

Existe escasa información sobre su biología reproductiva. Nidifica cerca o dentro de colonias de gaviotas, pingüinos y cormoranes. Generalmente pone dos huevos.

Estado de Conservación

La UICN ha categorizado a esta especie como de **Preocupación menor** (LC) en el año 2008. Si bien las tendencias de la población a nivel mundial no han sido evaluadas, no parece haber cambios que sugieran que la población este disminuyendo.



Gaviota Austral o Gris

M

Larus scoresbii



Distribución

Se distribuye en las costas del sur de América del Sur. Desde los 42° S sobre el Pacífico y los 44° S sobre el Atlántico, hasta Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas. En Argentina nidifica desde Punta Tombo en Chubut, hasta las Islas Bridges en el Canal de Beagle, Tierra del Fuego.

Dimensiones

Mide aproximadamente 38 cm de largo.

Peso

Pesa aproximadamente 520 g.

Características morfológicas

Su cuerpo es de color grisáceo pardo, con el dorso y las alas negras. Posee pico, patas y un anillo alrededor del ojo de color rojo. Sus ojos son amarillos claros. Durante la etapa no reproductiva el plumaje es similar, con su cabeza más oscura. Los juveniles son grisáceos con capucha y banda en la cola negras.

Comportamiento general

Se la observa en colonias de lobos y elefantes marinos. También en colonias de cormoranes y gaviotas, donde está alerta a la oportunidad de robar huevos.

Alimentación

Se alimenta de excrementos de lobos y elefantes marinos, de huevos de otras aves y de presas que traen las aves a sus pichones, incluso de regurgitados de pingüinos o cormoranes.

Reproducción

Se reproduce en colonias pequeñas, de hasta 200 parejas. Los nidos se ubican sobre suelos rocosos, de suave declive, sin cobertura vegetal y alejados de la vegetación. Siempre en sitios cercanos a colonias de aves y mamíferos marinos. En Punta Tombo, comienzan su reproducción en noviembre. En general cada hembra pone entre 2 y 3 huevos, que incuba por 24 a 27 días. Entre los 2 y 5 días de nacimiento, los pichones se alejan del nido siguiendo a sus padres hacia afuera de la colonia, donde permanecen separados de otras parejas. A medida que crecen, los pichones se juntan en “guarderías” con los otros pichones de la colonia.

Estado de Conservación

La población de esta especie en Argentina es de sólo 700 parejas. Sin embargo, no se han observado cambios drásticos en su población en Sudamérica, por lo cual la UICN la categoriza en el año 2008 como de **Preocupación menor** (LC). El aumento poblacional de la Gaviota Cocinera podría tener un impacto negativo sobre esta especie ya que compite por los sitios de nidificación y preda sobre sus huevos.

Gaviota Cocinera

M

Larus dominicanus

Distribución

Es una especie ampliamente distribuida en las costas e islas del Hemisferio Sur.

En la costa argentina se reproduce desde Claromecó, en la provincia de Buenos Aires, hasta Bahía Ushuaia en Tierra del Fuego.

Dimensiones

Mide 55 cm.

Peso

Pesa aproximadamente 1,3 Kg.

Características morfológicas

Es grande y conspicua, blanca, con dorso negro y la parte superior de las alas negra con bordes blancos. El pico es amarillo con la punta de la mandíbula inferior roja. Presenta anillos oculares rojos. Las patas son de color verde amarillento. Los juveniles tienen la cabeza y el dorso jaspeados de gris pardo y el vientre claro. El pico y las patas son negruzcos.

Comportamiento general

Muchas veces se encuentra en colonias de otras aves y mamíferos marinos, en puertos, playas, muelles y restingas del intermareal. También se la observa en espejos de agua en la estepa y la cordillera sur. Suele estar en bandadas de varios miles de individuos, a veces, con biguás, gaviotines y ostereros. Durante la noche retorna a dormideros que cada bandada mantiene año tras año. Se asocia frecuentemente a pesquerías de arrastre de langostino y merluza.

Alimentación

Es una especie de hábitos alimentarios mayormente costeros que muestra diversas técnicas de alimentación. Se alimenta de cardúmenes de peces junto a otras aves y mamíferos marinos. Roba huevos y pichones de pingüinos, cormoranes y gaviotines, y también roba el alimento a otras aves marinas. Además, se alimenta de pequeños invertebrados en la zona intermareal. Con frecuencia se posa en el dorso de las ballenas francas para arrancarles trozos de piel. Sus hábitos generalistas le permiten alimentarse en basurales y del descarte de los buques de pesca.

Reproducción

Forma grandes colonias dispersas, con nidos ubicados en terrenos abiertos o entre arbustos. El nido es una leve depresión en el suelo. La puesta de huevos ocurre entre octubre y noviembre. Cada pareja pone 2 o 3 huevos con manchas de color pardo, gris o verdoso, que incuba durante 27 días.

Estado de Conservación

Es probable que siempre haya sido una especie abundante. Sin embargo, los basurales que rodean los centros urbanos de Patagonia y los descartes pesqueros representan una provisión de comida durante todo el año, resultando en el crecimiento de la población de esta especie. El aumento de tamaño de algunas colonias puede afectar negativamente a otras especies sobre las cuales predadora, roba su alimento o compite por el espacio para nidificar. La UICN ha categorizado a esta especie, en el año 2008, como de **Preocupación menor** (LC).



aves marinas

aves terrestres

flora

Mamíferos marinos

Mamíferos terrestres

Gaviota de Olrog

M

Larus atlanticus

Distribución

Es una especie endémica de la costa argentina. Su distribución reproductiva se limita a dos áreas: el sector comprendido entre el estuario de Bahía Blanca y la Bahía Anegada, en el sur de Buenos Aires, y el norte del golfo San Jorge, en la provincia de Chubut.

Dimensiones

Miden 48 cm de largo.

Peso

Los adultos pesan aproximadamente 800 g.

Características morfológicas

Su cuerpo es blanco con el dorso negro. La parte dorsal de las alas es negra, con el borde blanco. Se diferencia de la Gaviota Cocinera por su banda negra en la cola y por el extremo rojo y negro en su pico amarillo. Las patas son amarillas. Durante la etapa no reproductiva su cabeza es grisácea.

Comportamiento general

Suele verse en bandadas. Es muy confiada.

Alimentación

Su dieta durante la temporada reproductiva es muy especializada, consiste casi exclusivamente en cangrejos. Durante la temporada no reproductiva también se alimenta de peces y crustáceos.

Reproducción

Sus colonias son compactas y frecuentemente están ubicadas junto a colonias de otras gaviotas y gavio-tines. Todas las colonias de esta especie se ubican en islas próximas a zonas intermareales con presencia de cangrejos. Construye sus nidos en áreas desprovistas de vegetación. En Chubut, comienza a poner sus huevos a fines de octubre y los incuba por 30 días.

Estado de Conservación

Más del 90% de la población reproductiva de la Gaviota de Olrog nidifica en el sur de la provincia de Buenos Aires, un sector de costa expuesto a la creciente actividad humana. En particular, en el estuario de Bahía Blanca donde se desarrolla una intensa actividad industrial y pesquera. En el resto de las colonias existe cierta actividad turística que también podría producir un impacto en las poblaciones de Gaviota de Olrog. Dado que la población total de esta especie es de tan sólo 2300 parejas, y debido a la extrema dependencia de un hábitat particular como son los cangrejales, la Gaviota de Olrog ha sido calificada por la UICN en el 2008 como **Vulnerable** (VU).



Gaviota Capucho Café

M

Larus maculipennis

Distribución

Se distribuye desde Tierra del Fuego hasta el norte de Brasil por el Océano Atlántico, y hasta el norte de Chile por el Pacífico. Posee una distribución muy amplia, incluyendo no sólo la franja costera de Argentina sino también áreas continentales, particularmente campos y lagunas de agua dulce.

Dimensiones

Mide 35 cm.

Peso

Pesa aproximadamente 300 g.

Características morfológicas

Su dorso es color gris claro y el vientre presenta un tinte rosa pálido. Posee en su cabeza una capucha de color castaño oscuro, casi negro. Su pico y patas son de color rojo. En el invierno su cabeza es blanca con una pequeña mancha oscura detrás de los ojos. Las patas y el pico se tornan grisáceas.

Comportamiento general

Se la observa en bandadas. En el campo acompaña a los arados junto a gaviotas cocineras y chimangos, alimentándose de insectos.

Alimentación

La alimentación de esta especie es muy variada. Consume presas vivas como crustáceos, peces e insectos y carroña, restos de origen humano y presas robadas a otras especies. También es muy importante su alimentación en campos de cultivo, donde consume principalmente lombrices e insectos.

Reproducción

Se reproduce en lagunas de agua dulce con abundante vegetación. Forma colonias de tamaño variado, desde algunas decenas de nidos hasta varios centenares. Construye un nido grande con ramas pequeñas en el suelo o en matas de pasto o vegetación baja. Pone 3 o 4 huevos. Los pichones nacen en noviembre y abandonan el nido en febrero.

Estado de Conservación

La Gaviota Capucho Café es una especie ampliamente distribuida. Si bien no existen estimaciones de su tamaño poblacional, no se han observado disminuciones en su número. La UICN en el año 2008 la ha categorizado como de *Preocupación menor* (LC).



Gaviotín Sudamericano

M

Sterna hirundinacea

Distribución

Se reproduce en las costas atlántica y pacífica, desde el sur de Brasil y Perú hasta Tierra del Fuego, incluyendo las Islas Malvinas.

Dimensiones

Los adultos miden 38 cm de largo.

Peso

Los adultos pesan aproximadamente 180 g.

Características morfológicas

Los gaviotines son similares a las gaviotas, aunque mas delgados y estilizados. Su dorso es gris y el vientre blanco. Poseen una larga cola ahorquillada. El color del pico varía entre negro y rojo apagado. El plumaje de la frente es blanco y la parte posterior de la cabeza (corona) está jaspeada de blanco y negro. Durante la etapa reproductiva su corona se torna negra y el vientre gris. Las patas y el pico durante esta etapa son rojos.

Comportamiento general

Se los observa en bandadas numerosas. Es común verlos descansando en playas y costas rocosas junto con gaviotas, chorlos y otras especies de gaviotines. Generalmente, la bandada levanta vuelo en forma conjunta. Son aves migratorias, una vez finalizada la reproducción abandonan sus colonias y migran hacia el norte, llegando la población argentina hasta el sur de Brasil.

Alimentación

Se alimenta de pequeños peces (principalmente anchoita y pejerrey) y crustáceos. Se desplaza en grupos observando el agua en busca de alimento. Cuando avistan peces, se zambullen desde el aire, en picada, y emergen enseguida.

Reproducción

Reproducen en colonias en la costa o en islas. La puesta comienza entre noviembre y enero. Cada pareja pone entre 1 y 2 huevos que incuba durante aproximadamente 20 días. Los nidos son simplemente un hueco en el suelo sin material de revestimiento. Los pichones abandonan el nido al mes de nacer y se agrupan en "guarderías" en la playa esperando a que los adultos los alimenten.

Estado de Conservación

Son aves muy sensibles al disturbio ocasionado por las visitas a sus colonias, lo que a menudo produce el abandono temporario o la deserción de sus nidos. Durante la ausencia de los adultos, los huevos y pichones quedan expuestos a la predación. El continuo cambio en sus localidades reproductivas ha dificultado estimar el tamaño de la población en la costa patagónica. El incremento en las poblaciones de Gaviota Cocinera podría resultar en efectos negativos sobre el Gaviotín Sudamericano a través de la predación de huevos y pichones, el cleptoparasitismo (robo de alimento) y la competencia por el espacio para nidificar. Esta especie ha sido categorizada en el año 2008 por la UICN como de **Preocupación menor** (LC).



Gaviotín Pico Amarillo

M

Sterna eurygnatha

Distribución

Se distribuye desde el mar Caribe por la costa atlántica hasta el sur de Argentina. En la costa Argentina se reproduce desde la provincia de Buenos Aires hasta la Ría Deseado (Santa Cruz).

Dimensiones

Los adultos miden 41 cm de largo.

Peso

Los adultos pesan aproximadamente 250 g.



Características morfológicas

Su cuerpo es relativamente grande y robusto. El dorso es gris perlado y el vientre blanco. La frente, la parte posterior de la cabeza y la cresta son negras. Posee un pico amarillo largo y delgado. Su cola es bifurcada. Durante la época no reproductiva la frente se torna blanca.

Comportamiento general

Se lo observa descansando en bandadas en la costa, junto al Gaviotín Sudamericano y al Gaviotín Real. Su vuelo es errático e irregular. Son aves migratorias. Al finalizar la temporada reproductiva migran hacia el norte por el Atlántico.

Alimentación

Se alimentan lejos de la costa y su dieta en la etapa reproductiva incluye anchoitas, cornalitos, pejerrey y sardinas fueguinas. Cuando avistan peces, se zambullen desde el aire, en picada, y emergen enseguida con la presa atrapada en su pico. También obtienen alimento a través del cleptoparasitismo (es decir, robándole sus presas a otras aves).

Reproducción

Forma colonias muy grandes y densas, generalmente junto con los gaviotines reales y sudamericanos. Se han encontrado nidos a tan solo 20 m de la línea de marea, en áreas sin vegetación o en sectores de suelo desnudo rodeados de vegetación. La ubicación de la colonia puede variar entre años. Previo al asentamiento en la colonia, los gaviotines pico amarillo desarrollan actividades de cortejo y formación de parejas. Para ello, se mantienen muy erguidos, elevan la cresta, abren parcialmente las alas y elevan la cola. Construye nidos pequeños en forma de taza directamente sobre la tierra o la playa. Generalmente cada hembra pone un solo huevo. La mayor parte de las hembras de la colonia pone sus huevos el mismo día que se asienta en la colonia. El periodo de incubación es de 29 días aproximadamente. A los 20 días de edad, los pichones abandonan la colonia y forman grupos en la playa, donde continúan siendo alimentados por sus padres.

Estado de Conservación

Son aves muy sensibles al disturbio ocasionado por las visitas a sus colonias, lo que a menudo produce el abandono temporario o la deserción de sus nidos. Durante la ausencia de los adultos, los huevos y pichones quedan expuestos a la predación. El continuo cambio en sus localidades reproductivas ha dificultado estimar el tamaño de la población en la costa patagónica. El incremento en las poblaciones de Gaviota Cocinera podría resultar en efectos negativos sobre el Gaviotín Pico Amarillo a través de la predación de huevos y pichones, el cleptoparasitismo (robo de alimento) y la competencia por el espacio para nidificar. El estado de conservación de esta especie no ha sido evaluado por la UICN.

Gaviotín Real

M

Sterna maxima

Distribución

Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. En la costa de nuestro país se reproduce desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz.

Dimensiones

Los adultos miden 46 cm de largo.

Peso

Los adultos pesan aproximadamente 450 g.



Características morfológicas

Su cuerpo es relativamente grande y robusto. El dorso es gris perlado y el vientre blanco. La frente, la parte posterior de la cabeza y la cresta son negras. Posee un pico grande color rojo anaranjado. Su cola es bifurcada. Durante la época no reproductiva la frente se torna blanca y el pico más apagado.

Comportamiento general

Se lo observa descansando en bandadas en la costa, junto a otros gaviotines y gaviotas. Su vuelo es errático e irregular. Son aves migratorias, al terminar su temporada reproductiva migran por el Atlántico hacia el norte.

Alimentación

Se alimentan lejos de la costa y su dieta en la etapa reproductiva incluye anchoitas, cornalitos, pejerrey y sardinas fueguinas. Cuando avistan peces, se zambullen desde el aire, en picada, y emergen enseguida con la presa atrapada en su pico. También obtienen alimento a través del cleptoparasitismo (es decir, robándole sus presas a otras aves).

Reproducción

Forma colonias grandes y compactas, generalmente junto a otros gaviotines, en la parte superior de playas y entre arbustos cercanos a la costa. La ubicación de la colonia puede cambiar entre años. Generalmente cada hembra pone un solo huevo. La mayor parte de las hembras pone sus huevos el mismo día que se asienta en la colonia, en general a fines de la primavera. El periodo de incubación es de 25 días aproximadamente. Los pichones abandonan los nidos y forman grupos en la playa, donde continúan siendo alimentados por sus padres.

Estado de Conservación

Son aves muy sensibles al disturbio ocasionado por las visitas a sus colonias, lo que a menudo produce el abandono temporario o la deserción de sus nidos. Durante la ausencia de los adultos, los huevos y pichones quedan expuestos a la predación. El continuo cambio en sus localidades reproductivas ha dificultado estimar el tamaño de la población en la costa patagónica. El incremento en las poblaciones de Gaviota Cocinera podría resultar en efectos negativos sobre los gaviotines reales a través de la predación de huevos y pichones, el cleptoparasitismo (robo de alimento) y la competencia por el espacio para nidificar. Esta especie ha sido categorizada en el año 2008 por la UICN como de **Preocupación menor** (LC).

Categorías utilizadas por UICN para definir el estado de conservación de las especies.

La abreviatura de las siglas para inventariar el estado de cada especie, corresponde a su nomenclatura en inglés:

- **EX Extinct.** Extinto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo vivo.
- **EW Extinct in the wild.** Extinto en estado silvestre. Una especie está Extinta en estado silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- **CR Critically Endangered.** En peligro crítico. Una especie está En peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para esta categoría, propuestas por la Comisión de Supervivencia de Especies de UICN¹. Estos criterios están relacionados con su tamaño poblacional, con el grado de reducción del mismo y de su distribución. Se considera que una especie en este estado está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **EN Endangered.** En peligro. Categoría definida cuando la especie responde a a los criterios definidos para esta categoría²
- **VU Vulnerable.** Vulnerable. Categoría definida cuando la especie responde a los criterios definidos para esta categoría³.
- **NT Near Threatened.** Cercano a la amenaza. Una especie está en la categoría de Cercano a la amenaza, cuando ha sido evaluada según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En peligro crítico, En peligro o Vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **LC Least Concern.** Preocupación menor. Una especie está en la categoría de Preocupación menor cuando habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen a las categorías anteriores. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución.
- **DD Data Deficient.** Datos insuficientes. Una especie pertenece a la categoría Datos insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Una especie en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. No es una categoría de amenaza.
- **NE Not Evaluated.** No evaluado. Una especie se considera No evaluada cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

(1), (2), (3) Hay un sistema jerárquico alfanumérico de criterios y subcriterios para los niveles En peligro crítico, En peligro y Vulnerable, publicado en “Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN”, versión 3.1, preparado por la Comisión de Supervivencia de Especies de UICN, aprobado en la 51ª reunión del Consejo de la UICN, Gland, Suiza, 9 febrero 2000.

Para mayor información se puede contactar al encargado del programa en redlist@ssc-uk.org, o consultar http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_sp_v1223290226.pdf

Bibliografía consultada

- Bala, L. O. 2006. Humedales de la Península Valdés y aves playeras migratorias. Una síntesis de procesos biológicos y ecológicos con fines conservacionistas. Publicación del CENPAT.
- Celano, M., R. 2007. Guía fotográfica de identificación de aves marinas del Atlántico Sur. Una completa ayuda visual para Observadores Científicos embarcados en buques de pesca. Fundación Vida Silvestre Argentina.
- Del Hoyo J, Elliot A y Sargatal J (Eds.) 1992 Handbook of the birds of the World. Vol. 1: Ostrich to ducks. Lynx Edicions, Barcelona, España.
- Del Hoyo J, Elliot A y Sargatal J (Eds.) 1996 *Handbook of the birds of the World*. Vol. 3: Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona, España.
- Harris, G. 2008. Guía de aves y mamíferos de la costa patagónica. El Ateneo.
- Harrison, P. 1985. Seabirds. An identification guide. Houghton Mifflin Company.
- Hayman, P., Marchant, J., Prater, T. 1986. Shorebirds. And identification guide to the waders of the world. Houghton Mifflin Company.
- Narosky, T., Yzurieta, D. 1993. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vázquez Manzini Editores.
- Petracci, P. F., Canevari, M., Bremer, E. 2005. Guía de las aves playeras y marinas migratorias del sur de América del Sur. Escuelas hermanas de Aves Playeras.
- Schreiber, E.A., Burger, J. 2001. Biology of marine birds. CRC Press.
- Yorio, P., Quintana, F., Lopez de Casenave, J. (Eds). 2005. Ecología y Conservación de las aves marinas del litoral marítimo argentino. El Hornero 20. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata.

Sitios de Internet consultados

- Pagina web de Cornell Lab of Ornithology: <http://www.birds.cornell.edu/AllAboutBirds>



Consolidación e Implementación del Plan de Manejo Integrado
de la Zona Costera Patagónica para la Conservación de la Biodiversidad
ARG/02/G31